

OBSERVATIONS DE TORTUES MARINES SUR LES CÔTES DE FRANCE EN 1985

par R. DUGUY *

Résumé. — Au cours de l'année 1985, trente-deux observations de Tortues luth (*Dermochelys coriacea*) ont été rapportées pour l'ensemble des côtes de France : une en Méditerranée, deux en Manche et vingt-neuf en Atlantique où la fréquence maximale se situe sur les côtes sud de Vendée et celles de la Charente-Maritime. La découverte d'une jeune Tortue de Ridley (*Lepidochelys kempi*) à l'île de Ré est la quatrième observation connue pour cette espèce sur les côtes de France.

Summary. — Thirty two Leatherback turtles (*Dermochelys coriacea*) have been recorded for the year 1985 on the coast of France. One was found in the Mediterranean, two in the Channel, and twenty nine in the Atlantic ones with a main frequency near the southern coasts of Vendée and on the Charente-Maritime. A young Ridleys' turtle has been discovered in the island of Ré, adding the fourth record for this species on the French coast.

TORTUE LUTH (*Dermochelys coriacea*)

Au cours de l'année 1985, trente-deux observations de Tortues luth ont été rapportées pour l'ensemble des côtes de France mais, compte tenu des groupes observés, le nombre total d'individus observés s'élève à trente-quatre, au total. A l'exception d'une tortue trouvée en Méditerranée, et de deux en Manche, toutes les autres ont été signalées sur les côtes atlantiques. La répartition des observations montre des variations de fréquence analogues à celles des années précédentes : 4 au nord de la Loire, 24 entre la Loire et la Gironde, et 1 au sud de la Gironde. D'une manière plus précise, on peut constater que les zones les plus fréquentées sont situées, l'une entre les Sables-d'Olonne et l'île de Ré (10 observations), et la seconde dans le Pertuis d'Antioche. Il est à noter que ces nombres sont exactement les mêmes que ceux trouvés en 1984 et confirment qu'au cours de ces dernières années les Tortues luth fréquentent plus volontiers le Pertuis d'Antioche que

* Muséum de la Rochelle, 28, rue Albert-1^{er}, 17000 la Rochelle.

Ann. Soc. Sci. nat. Charente-Maritime, 1986, 7 (4) : 543-546.



l'intérieur du Pertuis Breton, comme elles le faisaient précédemment. Le maximum saisonnier est resté le même et se situe pendant le mois d'août, pour les animaux observés en mer.

Neuf tortues trouvées mortes sur la côte, sept au total, l'ont été en automne et en hiver. Trois d'entre elles ont été autopsiées et ne contenaient pas de déchets de plastique dans l'estomac. Seule la tortue trouvée noyée dans un filet au Grau-du-Roi avait deux sacs plastiques dans la première poche gastrique (Duron, *comm. pers.*).

LISTE DES OBSERVATIONS

- Trouvée morte sur la plage de la Mine, à Talmont (Vendée) le 28 janvier.
Sexe ? Longueur : 120 cm (sans tête).
- Trouvée morte au Grau-du-Roi (Gard) le 5 juin.
Femelle ; longueur totale : 193 cm ; carapace : 130 cm.
Crâne et membres conservés au Muséum de Marseille : 1985-7 RDC1.
- Observée dans le Pertuis d'Antioche (Charente-Maritime) le 30 juin.
- Observée à 3 milles SW des Sables-d'Olonne (Vendée) le 8 juillet.
- Observée à 5 milles de la pointe de Grave (Gironde) le 31 juillet.
- Observée dans le Pertuis d'Antioche (Charente-Maritime) le 1^{er} août.
- Capturée dans un filet et relâchée à Barbâtre (Vendée) le 4 août.
- Capturée dans un filet à 5 milles W d'Ars-en-Ré (Charente-Maritime) le 9 août.
Relâchée et retrouvée morte à Ars-en-Ré le 12 août.
Mâle ; longueur totale : 228 cm ; carapace : 161 cm.
Crâne conservé au Muséum de la Rochelle : R.1198.
- Deux tortues observées au N.E. du phare des Baleines (Charente-Maritime) le 13 août.
- Observée au N.E. du phare des Baleines (Charente-Maritime) le 13 août.
- Trouvée morte à Barbâtre (Vendée) le 14 août.
Sexe et longueur indéterminés.
- Deux tortues observées à 2 milles E du phare des Baleines (Charente-Maritime) le 17 août.
- Observée dans le Pertuis d'Antioche (Charente-Maritime) le 19 août.
- Capturée dans un orin de casier et relâchée près de Sarzeau (Morbihan) le 21 août.
- Observée au N.E. du phare des Baleines (Charente-Maritime) le 21 août.
- Observée dans le Pertuis d'Antioche (Charente-Maritime) le 22 août.
- Observée à 3 milles au S. de Jard (Vendée) le 26 août.
- Observée à 1 mille NW de l'île d'Aix (Charente-Maritime) le 29 août.
- Trouvée morte à Mimizan (Landes) le 7 septembre.
Mâle ; longueur totale : 197 cm ; carapace : 154 cm.
- Observée au N.E. du phare des Baleines (Charente-Maritime) le 15 septembre.
- Observée à 10 milles S. de l'île d'Yeu (Vendée) le 20 septembre.
- Observée à 2 milles N. de l'île d'Aix (Charente-Maritime) le 30 septembre.

- Capturée au chalut pélagique à 4 milles des Sables-d'Olonne (Vendée) le 1^{er} octobre.
Marquée (Muséum de la Rochelle n° 4) et relâchée le même jour.
Mâle; longueur totale: 230 cm; carapace 157 cm. Porteuse de 2 *Remora remora* et accompagnée d'un *Naucrates ductor*.
- Observée à 3 milles des Sables-d'Olonne (Vendée) le 1^{er} octobre.
- Trouvée morte à Saint-Denis-d'Oléron (Charente-Maritime) le 4 octobre.
Femelle; longueur totale: 200 cm; carapace: 151 cm.
- Trouvée morte à Vannes (Morbihan) le 4 octobre.
Sexe? Longueur totale: 200 cm; carapace: 150 cm.
- Capturée dans un orin de casier et remise en liberté à Antifer (Seine-Maritime) le 5 octobre.
Femelle; longueur totale: 200 cm.
- Capturée au chalut près de Talmont (Vendée) le 10 octobre. Marquée (Muséum de la Rochelle n° 10) et relâchée le même jour.
Femelle.
- Capturée au chalut pélagique à 3 milles W du Pertuis de Maumusson (Charente-Maritime) et ramenée morte à La Cotinière.
Mâle; longueur totale: 230 cm; carapace: 158 cm.
- Capturée dans un filet et relâchée à 1 mille de Veules-les-Roses (Seine-Maritime) le 7 novembre.
- Trouvée morte à Moëlan (Finistère) le 20 décembre.
Sexe? Carapace: 150 cm.
- Trouvée morte à Piriac (Loire-Atlantique) le 27 décembre.
Femelle; carapace: 151 cm.

TORTUE DE RIDLEY (*Lepidochelys kempii*)

Le 21 novembre 1985, une Tortue de Ridley fut découverte vivante, remuant à peine, sur la plage nord de Saint-Martin, à l'île de Ré (Charente-Maritime), soit à 46°13'N/1°22'W. Il est à noter que la température de l'eau de mer était, à cette date, de 9°8. La tortue fut transportée au Musée océanographique de la Rochelle où elle mourut quelques heures après. Cette jeune femelle pesait 3,370 kg, et sa carapace mesurait 285 mm de longueur, sur 275 mm de largeur. Ce spécimen est conservé, naturalisé, au Muséum de la Rochelle (R. 1200).

Cette observation est la quatrième pour cette espèce sur les côtes de France, toutes localisées sur les côtes atlantiques. La première avait été trouvée en 1926 à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques); mesurant 290 de longueur sous la carapace, et de sexe indéterminé, elle a été conservée naturalisée au Musée d'Histoire naturelle de Bayonne sous le n° 1926-26 (Brongersma, 1969). Un autre exemplaire naturalisé appartient au Musée de la mer, à Saint-Clément-des-Baleines (Charente-Maritime). Découverte aux Portes, à l'île de Ré (Charente-Maritime), probablement vers les années 1950, elle est de sexe indéterminé; sa carapace mesure 267 mm de longueur sur 249 mm de large (Brongersma, 1972). Une troisième tortue fut découverte vivante près de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

le 25 décembre 1981 ; transportée au Musée de la mer, à Biarritz, elle y mourut peu après. Elle mesurait 230 mm de longueur pour la carapace et pesait 2,030 kg, mais son sexe n'a pas été déterminé. Il est important de noter que cette tortue avait été marquée (NNN 893) le 5 juin 1980 près de Homosassa, en Floride, dans le Golfe du Mexique : sa longueur était alors de 184 mm et son poids de 990 g (*Marine Turtle Newsletter*, 1983).

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- BRONGERSMA, L.D., 1969. — Miscellaneous notes on Turtles. II. A-B. *Proc. Kon. Ned. Akad. Wet.*, Amsterdam, C 72(1) : 76-102.
- BRONGERSMA, L.D., 1972. — European Atlantic turtles. *Zoologische verhandelungen*, Leiden, 121 : 318 p, 12 pl., 29 p de graph. et tableaux + 1 vol. de 8 cartes pliées.
- Marine Turtle Newsletter*, 1983. — n° 24 : 15-16.